

Impfkalender

(Standardimpfungen) für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Empfohlenes Impfalter und Mindestabstände zwischen den Impfungen



Impfstoff/Antigene	Alter in vollendeten Monaten						Alter in vollendeten Jahren			
	Geburt	2	3	4	11-14	15-23 siehe a)	5-6 siehe a)	9-17 siehe a)	ab18	≥60
Tetanus*		●	●	●	●		● A	● A	●●●●●	A*****
Diphtherie siehe b)		●	●	●	●		● A	● A	●●●●●	A*****
Pertussis*		●	●	●	●		● A	● A		
Haemophilus influenzae b*		●	● c)	●	●					
Poliomyelitis*		●	● c)	●	●			● A		
Hepatitis B*	● d)	●	● c)	●	●			● G		
Pneumokokken**		●	●	●	●					● S
Meningokokken					●●●●●	e)				
Masern, Mumps, Röteln***					●	●				
Varizellen					●	● f)		● h)		
Influenza****										● S

229826 0096 (3)WBH

Um die Zahl der Injektionen möglichst gering zu halten, sollten vorzugsweise Kombinationsimpfstoffe verwendet werden. Impfstoffe mit unterschiedlichen Antigenkombinationen von D/d, T, aP/ap, HB, Hib, IPV sind bereits verfügbar. Bei Verwendung von Kombinationsimpfstoffen sind die Angaben des Herstellers zum Impfalter und den Impfabständen zu beachten.

- A Auffrischimpfung: Diese sollte möglichst nicht früher als 5 Jahre nach der vorhergehenden letzten Dosis erfolgen.
- G Grundimmunisierung aller noch nicht geimpften Jugendlichen bzw. Komplettierung eines unvollständigen Impfschutzes
- S Standardimpfungen mit allgemeiner Anwendung = Regelimpfungen
- a) Zu diesen Zeitpunkten soll der Impfstatus unbedingt überprüft und gegebenenfalls vervollständigt werden.
- b) Ab einem Alter von 5 bzw. 6 Jahren wird zur Auffrischimpfung ein Impfstoff mit reduziertem Diphtherietoxoid-Gehalt (d) verwendet.
- c) Bei monovalenter Anwendung bzw. bei Kombinationsimpfstoffen ohne Pertussiskomponente kann diese Dosis entfallen.
- d) Siehe Anmerkungen „Postexpositionelle Hepatitis-B-Immunprophylaxe bei Neugeborenen“ (Epid. Bulletin 30/2006, S.237)
- e) Ab dem vollendeten 12. Lebensmonat. Der Meningokokkenkonjugatimpfstoff sollte nicht gleichzeitig mit Pneumokokkenkonjugatimpfstoff oder MMR und Varizellenimpfstoff oder MMRV gegeben werden.

- f) Bei Anwendung des Kombinationsimpfstoffes MMRV sind die Angaben des Herstellers zu beachten. Entsprechend den Fachinformationen ist die Gabe einer 2. Dosis gegen Varizellen erforderlich. Zwischen beiden Dosen sollten 4 – 6 Wochen liegen.
- h) Nach Angaben des Herstellers für monovalenten Varizellenimpfstoff: 1 Dosis bei Kindern vor dem vollendeten 13. Lebensjahr; 2 Dosen im Abstand von mindestens 6 Wochen bei Kindern ab 13 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen
- * Abstände zwischen den Impfungen mindestens 4 Wochen; Abstand zwischen vorletzter und letzter Impfung mindestens 6 Monate
- ** generelle Impfung gegen Pneumokokken für Säuglinge und Kleinkinder mit einem Pneumokokken-Konjugatimpfstoff; Standardimpfung für Personen ≥ 60 mit Polysaccharidimpfstoff und Wiederimpfung im Abstand von 6 Jahren
- *** Mindestabstand zwischen den Impfungen 4 Wochen
- **** jährlich mit dem von der WHO empfohlenen aktuellen Impfstoff
- ***** jeweils 10 Jahre nach der letzten vorangegangenen Dosis

Herausgeber und ©:
Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH & Co. KG, Postfach 1630, 35006 Marburg